



H.B. Fuller



Foster® First Defense 40-97 EU

Indicações de Aplicação

1. Remover impurezas maiores da superfície.
2. Diluir em função da aplicação (ver verso). Evitar o contacto com os olhos e a pele. Evitar a formação de aerossóis. Use equipamento de proteção adequado (luvas e proteção ocular, vestuário e calçado de proteção). Preparar a solução de fresco diretamente antes da utilização e substituir a mesma se estiver visivelmente suja ou diluída.
3. Aplicar na superfície e limpar, acionamento do aplicação de pulverização (com ou sem limpar), Aplicar & Limpar, amolecer ou aplicação de espuma com baixa pressão. Observar as boas práticas de higiene no trabalho durante a aplicação do produto diluído; usar luvas, fato e/ou calçado de proteção, se necessário. Aplicar 30-50 ml/m², para que a superfície fique completamente humedecida, e deixar atuar 5-60 minutos em conformidade com o requisito (ver verso). A superfície tem de estar humedecida durante todo o tempo de contacto.
4. Enxaguar ou deixar secar ao ar. As superfícies desinfetadas que possam entrar em contacto com alimentos, têm de ser enxaguadas com água potável. O chão só tem de ser lavado caso se pretenda encerar ou polir o mesmo.
5. O produto não pode ser usado em combinação com outros biocidas ou produtos de limpeza.
6. Verificar a compatibilidade com a superfície num local escondido.

Primeiros socorros:

Inalação: Levar a pessoa afetada para um local com ar fresco. Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória aplicar respiração artificial. Administrar oxigénio. O socorrista tem de se proteger a si próprio. Consultar imediatamente um médico.

Contacto com a pele: Tirar imediatamente vestuário sujo e saturado. Em caso de contato com a pele, lavar de imediato com muito sabão e água. Consultar imediatamente um médico.

Contacto com os olhos: Enxaguar de imediato e abundantemente com água durante, pelo menos, 15 minutos, também por baixo das pálpebras. Consultar imediatamente um médico.

Ingestão: Consultar imediatamente um médico. Bochechar a boca com água e beber bastante água. Não induzir o vômito sem instruções médicas. Nunca tentar administrar nada oralmente a uma pessoa em estado inconsciente.

Armazenamento e validade: Manter o recipiente bem fechado. Por forma a preservar a qualidade do produto, não armazenar o mesmo num local quente ou com radiação solar direta. Guardar num local seco, fresco e bem ventilado.

Eliminação:

Produto: Eliminar mediante observância das disposições das entidades locais. Entrar em contacto com a empresa de gestão de resíduos.

Embalagem contaminada: Eliminar como produto não usado.

Utilizar os produtos biocidas de forma prudente. Ler sempre a informação do produto e a etiqueta antes da utilização.



H.B. Fuller



Foster® First Defense 40-97 EU

Diluição e tempos de contacto

Organismo	Diluição (ml/l) / Tempo de contacto (min)	
	Setor da saúde	Aplicação industrial e institucional
Bactérias	70 / 5 ou 10 / 60	25 / 5
Levedura	2,5 / 5 ou 1,25 / 60	20 / 15
Esporos	50 / 60 (limpar a superfície antes da aplicação)	50 / 60 (limpar a superfície antes da aplicação)
Viruen	60 / 60	20 / 15 (apenas vírus envolvidos & norovírus)
Fungos	60 / 60	40 / 15

Aplicar 30-50 ml/m².
Frequência de aplicação: 1-2 vezes por dia ou em conformidade com as prescrições de higiene em vigor.
A superfície tem de estar humedecida durante todo o tempo de contacto.



Visite o website para informações mais detalhadas
www.fosterproducts.com/EU-Disinfectant

